

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสรวมสี่ สัตว์ที่โรคได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว หนู นก กระรอก กระแต กระจับปี่ ค้างคาว หรือแม้กระทั่ง ชะนี สัตว์เคี้ยวเอื้อง วัว ควาย แพะ สัตว์ป่าโรคที่ล่าด้วยที่สด ในประเทศไทย คือ สุนัข ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามักกล่าวร้อยละ 95 มีสาเหตุมาจากสุนัขกัดหรือข่วน รองลงมาคือ แมว ซึ่งสามารถตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในน้ำลายสัตว์ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้า

1. เมื่อมีของมาจับผม
ตัวผมเป็นระยะๆ

2. ดึงตัวผม
ก้ม หรือ หัน

3. เมื่อเข้าทางมาแค่
เล็กน้อย

4. เมื่อเดินทางไปด้าน
หลังผม

5. เมื่อเข้าสู่ผม

“โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

ระยะพักตัวอาจสั้นมาก
ไม่ถึงสัปดาห์หรืออาจนานเกิน
1 ปี อากาในคนเริ่มแรก คือ
เบื่ออาหาร เบื่อคน มีไข้ อ่อนเพลีย
มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด
แล้วอาการคันลามไปส่วนอื่น ต่อมาจะมีอาการกระสับกระส่าย
กั้วแสง กั้วลม ไม่ชอบเสียงดัง เพื่อเจอ กั้วลมลำบาก
โดยเฉพาของเหลว กั้วน้ำ ปวดท้องน้อยและกั้วมเมื่อ
ขากะตุก แขนหน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาจชัก เกร็ง อัมพาต
หมดสติ และตายในที่สุด

ระยะพักตัวของโรคหลังจาก
ถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง
3 - 8 สัปดาห์ ไม่นเกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน
หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซั่ม
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ผู้ที่จะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม
 ระยะที่แปด
 ผู้เริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวายตื่นเต้น
 หงุดหงิดไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก มานตาขยายกว้าง
 ระยะอัปพาต

สุนัขมีอาหารคางห้อยตก ล้มมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย็อนอาหารล้นมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนแปลย พงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด

มาบ่อแก้ว มาบ่อทราย

คำขวัญ

1
ปฏิสัมพันธ์กับการจัดซื้อ
ครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ 2-4 เดือน
แล้วมีผลกระทบอีกครึ่งเดียว
กำหนดเปิดและปิดบัญชี

2
ไม่ปล่อยลูกไปไหนพ่าน
ในที่สุดารณะ
การรักที่นำลูกออกจากบ้าน
ตัวอยู่ในสายตา

3
ไม่น่าสนใจไปเลย
และต้องทนทำเมด
ไม่ให้สูญพันธุ์มากเกินไป

๑๕๕๐ เมินเมญญูบ่อลัน
เมินล๑๑บ่อลัน

โรคพิษสุนัขบ้า

สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือ วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ตายแล้ว และไม่ก่อให้เกิดโรค วัคซีนนี้สามารถให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเมื่อถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคกัด วัคซีนมีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรค หากฉีดได้ครบตามกำหนด

ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเมื่อไหร่

การให้วัคซีนชนิดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีอยู่ 2 แบบ คือ

1. การให้เพื่อป้องกันก่อนได้รับเชื้อ (ก่อนถูกสัตว์กัด) ควรพิจารณาให้แก่ สัตว์แพทย์ สัตวบาล เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในหออปฏิบัติการพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในพื้นที่ป่าเขาของโรคนี้ ควรจะได้รับวัคซีนชนิดนี้เช่นกัน โดยจะต้องฉีด 3 เข็ม ที่วันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28
2. การให้วัคซีนหลังจากได้รับเชื้อ (หลังจากถูกสัตว์กัด)

บุคคลใดก็ตามที่ถูกกัดโดยสัตว์หรืออาจสัมผัสกับไวรัสพิษสุนัขบ้า ควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ และควรจะพบแพทย์โดยทันทีเพื่อทำแผลและให้วัคซีน

หากผู้รับวัคซีนยังไม่เคยได้รับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 5 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกให้เร็วที่สุด และเข็มต่อมาในวันที่ 3, 7, 14 และ 28 หลังเข็มแรก

นอกจากนี้ แพทย์อาจพิจารณาให้วัคซีนเข็มภูมิโนโกลบูลิน เพื่อช่วยเสริมการป้องกันโรคด้วย

หากผู้รับวัคซีนได้รับ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วจำนวน 6 เดือน ควรจะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 2 เข็ม

โดยฉีดเข็มแรก ให้เร็วที่สุด และอีกเข็มในวันที่ 3 หลังจากเข็มแรก หากเคยได้มาแล้ว 6 เดือน ให้ฉีดเข็มเพียงเข็มเดียว




เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ต้องทำดังนี้



ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้งให้ถึงกับแผล ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแผลสด



จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักหมา ไขว่ดูอาการ 10 วัน สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการป้องกันกับที่ถูกกัด



เมื่อถูกสัตว์สงสัยป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน รีด่วน
ต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา 10 วัน และหาหมอ

“ ”




กรมควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ



ป้องกันได้ด้วยวัคซีนทั้งในคนและในสัตว์



สคธ.11 นครศรีธรรมราช
http://odpc11.ddc.moph.go.th
www.facebook.com/dpc11.ddc Tel: 075 541 147 Fax: 075 542 229

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422