



ที่ นศ ๘๑๙๐๑/ว ๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
หมู่ที่ ๕ อำเภอเขียร์ใหญ่ นศ๘๐๑๙๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากทุกท่าน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส่วนที่๑๓ ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๖๐๕
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖ ราย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ ราย จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ราย จังหวัดระยอง ๑ ราย และจังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ราย และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ได้อย่างทันท่วงที โดยเน้นการนำสุนัข และแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี และเมื่อถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วน เลียบาดแผลให้รีบทำความสะอาดบาดแผลเบื้องต้น ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไปแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นสุนัขและแมวที่กำลังจะหมดภูมิคุ้มกันหรือหมดภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว ๑ ปี เพื่อป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวสู่คน รวมทั้งดำเนินการกำจัดสุนัขที่สงสัยว่ามีประวัติการสัมผัสกับสุนัขที่ตรวจพบเชื้อและสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า กรณีที่เจ้าของสัตว์ไม่ประสงค์ให้กำจัด ต้องกักขังเจ้าของสัตว์ให้ติดตามเฝ้าระวังดูอาการ อย่างน้อย ๖ เดือน ถ้ามีอาการสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งหัวสุนัขตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ถนนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก


สำนักปลัด อบต.

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐๗๕-๓๘๖๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@saimak.go.th

www.saimak.go.th



นครา ศรีธา ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

สัญญาณและอาการของโรคพิษสุนัขบ้า


มีอย่างไรบ้าง

สัญญาณและอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในระยะเริ่มแรกมีความคล้ายคลึงกับอาการไข้หวัดใหญ่ ซึ่งรวมถึงเป็นไข้ปวดหัวและความรู้สึกไม่สบายตัว ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันและอาจรู้สึกแสบร้อนและคันบริเวณที่ถูกกัด อาการเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่ระยะที่รุนแรงยิ่งขึ้น โดยผู้ป่วยจะมีอาการแสดงออกถึงการทำงานของสมองที่ผิดปกติ กระวนกระวายสับสนและหงุดหงิด เมื่อความรุนแรงของโรคดำเนินต่อไปผู้ป่วย จะมีอาการสับสนมีพฤติกรรมที่แปลกไป ประสาทหลอน และนอนไม่หลับ หากผู้ป่วยปรากฏอาการของโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากและแพทย์มักใช้การดูแลรักษาแบบประคับประคองจากประวัติทางการแพทย์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้รอดชีวิตหลังจากติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วเพียง 10 รายเท่านั้น



ดังนั้น ควรเฝ้าสังเกต และระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวคุณและคนที่คุณรักจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งควรพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า หากเดินทางไปยังประเทศบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า คือ พม่า กัมพูชา และอินโดนีเซีย (โดยเฉพาะบนเกาะบาห์ลี)

ข้อมูล ; ผศ.นพ.อัษฎา วิชากุล
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์



โรคพิษสุนัขบ้า



จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

โทรศัพท์ 075-386-218

www.saimak.go.th

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นเชื้อไวรัสที่โจมตีประสาทส่วนกลางทำให้เกิดโรคทางระบบประสาทและในหลายกรณีทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

การติดเชื้อ แพร่ผ่านทางน้ำลายเข้าสู่บาดแผลปากหรือดวงตา มักเกิดจากการถูกสัตว์กัด ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ แต่มีสัตว์เพียงไม่กี่ประเภทที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ สุนัข แมว ค้างคาว สกังก์ และ สุนัขป่า จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างไร

ข่าวดีเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

คือ สามารถป้องกันได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลายเข็มเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายสัปดาห์



โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงจากการเล่นกับสัตว์และไม่ได้ตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกสัตว์กัดและมักไม่แจ้งผู้ปกครองเมื่อถูกสัตว์ข่วน ถึงแม้โรคพิษสุนัขบ้าจะหลีกเลี่ยงได้ แต่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (the Center for Disease Control and Prevention; CDC) รายงานว่าคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าถึง 55,000 รายต่อปีโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ถึงแม้โรคพิษสุนัขบ้าจะป้องกันได้ด้วยวิธีการทางการแพทย์ แต่ทางที่ดี คือ การเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แก่ สัตว์เลี้ยง

- สังเกตอาการสัตว์เลี้ยงและระวังไม่ให้สัมผัสกับสัตว์ป่า
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าเมื่อต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
- รายงานการพบเห็นสัตว์จรจัดให้กับสำนักงานควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์
- อย่าเข้าหรือยั่วยุสัตว์จรจัด



ควรทำอย่างไรหากถูกสัตว์กัด

๑. หากถูกสัตว์จรจัดกัด ให้ทำความสะอาดบาดแผลทันทีด้วยน้ำและสบู่เพื่อความเสี่ยงในการติดเชื้อ หลังจากนั้นให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด แพทย์ที่มีประสบการณ์จะบอกได้ว่าผู้ที่ถูกกัดจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือที่เรียกว่ายาป้องกันหลังสัมผัสสัตว์ (post exposure prophylaxis; PEP) หรือไม่ โดยวินิจฉัยจากสัตว์ที่กัดมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่
๒. แผลมีความรุนแรงมากพอต่อการได้รับวัคซีน
๓. การรักษาจำเป็นต้องใช้ภูมิโนโกลบูลิน (ซึ่งหายากในบางครั้ง) ร่วมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ (ในกรณีส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาทั้งสองประเภทร่วมกันเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการป้องกันโรค

www.saimak.go.th





จะอย่างไรหากถูกสุนัขหรือแมวที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด

1. รีบล้างบริเวณแผลด้วย สบู่ “ทันที”
2. รีบไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยวัคซีนป้องกันโรคให้ทันท่วงที
3. รีบกักสัตว์เพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง



รักน้องหมา อย่าลืมพาน้องไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะ



คาถา 5 ย กันสุนัขกัด

- ย1 อย่าแหย่สุนัขให้โมโห
- ย2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ
- ย3 อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
- ย4 อย่าหยิบ จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร
- ย5 อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ



ประชาสัมพันธ์
โรคพิษสุนัขบ้า
รู้ไว้... ป้องกันได้



หน่วยป้องกันพิษสุนัขบ้า

อบต.ไส้หมาก

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลไส้หมาก
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. โทรสาร 075-386-218

เว็บไซต์ www.saimak.go.th



เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากอะไร
โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า
เรบีสไวรัส



สัตว์ชนิดใดที่สามารถได้บ้าง

สัตว์ที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ซึ่งใน
ประเทศไทยพบการเกิดโรคในสุนัขมากที่สุด
ติดต่อจากทางไหนได้บ้าง

เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อ
ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ทางร่างกายทางบาดแผล
ที่ถูกกัด หรือ ข่วน หรือเข้าทางเยื่อเมือก
ปาก จมูก ที่มีแผลหรือรอยฉีกขาดได้ ซึ่ง
สุนัขหรือแมงสามารถแพร่เชื้อผ่านทาง
น้ำลายได้ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการป่วย



เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายของคน
แล้วจะเกิดอาการภายในกี่วันไม่แน่นอน
ระยะเวลาการเกิดโรคขึ้นอยู่กับบริเวณที่โดนกัด
ว่าใกล้เส้นประสาทและสมองมากน้อยเพียงใด
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้รักษาหายได้หรือไม่
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หาย
ได้ หากเป็นแล้วจะเสียชีวิตเท่านั้น สิ่งที่เรา
สามารถทำได้ คือการป้องกันโรค



สุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกที่อายุ 12
สัปดาห์ เข็มที่สองฉีดหลังจากเข็มแรก 3 - 4
สัปดาห์ และ หลังจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำเป็น
ประจำปี



อาการของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นอย่างไร

อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีแสดงอาการ
ออกมาทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม ซึ่งแบบดุร้าย
จะสามารถสังเกตอาการได้ชัด คือ สัตว์จะมี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปดุร้ายมากขึ้นสัตว์ที่โดยปกติ
จะชอบคลุกคลีกับคนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น
แยกตัวออกห่าง ชอบอยู่ในที่เงียบ ๆ แสดง
อาการทางระบบประสาทกระวนกระวายกัดแทะ
สิ่งของ กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า คางห้อยตกสั้น
มีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก



โรคพิษสุนัขบ้าพบเฉพาะหน้าร้อนใช่หรือไม่
ไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี

